

CRITÈRES DE PRIORITÉ EN TÉLÉCARDIOLOGIE

Type de service	Description	Priorité	Délai
Cardiologie générale	(NYHA 4) Inhabileté à faire toute activité physique sans inconfort. Les symptômes peuvent être présents au repos.	TRÈS URGENT	Transfert ou <= 24 heures. PAS POUR LA TÉLÉSANTÉ
	(NYHA 3) Limitation marquée des activités physiques. Les activités physiques moindres qu'ordinaires causent fatigue, palpitations, dyspnée ou angine.	URGENT	2 semaines
	(NYHA 2) Limitation légère des activités physiques. Les activités ordinaires causent de la fatigue, palpitations, dyspnée ou angine	SEMI-URGENT	<= 4 semaines
	(NYHA 1) Aucune limitation des activités physiques	NON-URGENT	<= 3 mois
Chirurgie cardiaque	Syndrome coronarien aigu, hémodynamiquement instable, arythmie maligne	TRÈS URGENT	Transfert ou <= 24 heures. PAS POUR LA TÉLÉSANTÉ
	Syndrome valvulaire aigu, hémodynamiquement instable		
	Syndrome vasculaire aigu, hémodynamiquement instable, anévrisme disséquant		
	Syndrome coronarien ou valvulaire aigu, réfractaire au traitement médical optimal par voie intraveineuse, atteinte sévère du tronc commun	URGENT	<72 heures
	Syndrome coronarien aigu stabilisé, état précaire, sous contrôle médical optimal, usager sous thérapie parentérale	SEMI-URGENT	<2 semaines
	Syndrome coronarien non-aigu, NYHA 4p		
	Syndrome valvulaire sévère, état précaire, hémodynamiquement stable, sous contrôle médical optimal, NYHA 4, usager hospitalisé à qui on ne peut donner son congé sans qu'il ait été opéré	SEMI-ÉLECTIF	< 6 semaines
Syndrome coronarien non-aigu, syndrome valvulaire stable, NYHA 3, usager non-hospitalisé			

Communiquez avec le Centre virtuel de santé et de services (CvSSS) pour en savoir plus

1 877 536-3202

www.cvsss.ca

Type de service	Description	Priorité	Délai
Chirurgie cardiaque	Autres situations	ÉLECTIF	<3 mois
Électrophysiologie	Instabilité hémodynamique, stimulateur endoveineux temporaire	TRÈS URGENT	< 24 heures PAS POUR LA TÉLÉSANTÉ
	Usagers hospitalisés en raison d'un diagnostic ou autres symptômes sévères	URGENT	< = 48 heures
	Stimulateur cardiaque/défibrillateur : nouvelle implantation sans dépendance, remplacement/repositionnement/extraction de l'électrode ou du boîtier avec dépendance, test de défibrillateur. Ablation : fibrillation auriculaire rapide, arythmie potentiellement maligne	SEMI-URGENT	< = 2 semaines
	Stimulateur cardiaque/défibrillateur : remplacement/repositionnement de l'électrode ou du boîtier sans dépendance, rehaussement, excrèse, moniteur implantable, étude du diagnostic. Ablation : arythmie récidivante, fibrillation auriculaire, Wolf-Parkinson-White, syncope	SEMI-ÉLECTIF	< = 4 semaines
	Cardioversion interne/externe, ablation (sans autre spécification)	ÉLECTIF	< = 3 mois
Insuffisance cardiaque	(NYHA 4) Inhabileté à faire toute activité physique sans inconfort. Les symptômes peuvent être présents au repos.	TRÈS URGENT	≤ 3 semaines
	(NYHA 3) Limitation marquée des activités physiques. Les activités physiques moindres qu'ordinaires causent fatigue, palpitations, dyspnée ou angine.	URGENT	≤ 4 semaines
	(NYHA 2) Limitation légère des activités physiques. Les activités ordinaires causent fatigue, palpitations, dyspnée ou angine	SEMI-URGENT	<= 6 semaines
	(NYHA 1) Aucune limitation des activités physiques.	NON-URGENT	<= 3 mois